

Beiträge zur Kenntniss der Microlepidopteren-Fauna der Erzherzogthümer Oesterreich ob und unter der Enns und Salzburgs.

Von Josef Mann in Wien.

(12. Fortsetzung.)

Trifariella Z. — 5, Bisamberg und Baden auf Berglehnen in jungen Gebüschchen.

Oriolella Z. — 6, auf dem Liechtenstein um Kiefern gefangen. Sack an *Coronilla* und *Astragalus*.

Fringillella Z. — 5, im Prater auf Wiesen.

Rectilinella F. R. — 7, Schneeberger Alpen, Heuplacke, Saugraben und Waxrigel.

Tractella Z. — 7, Schneeberg am Waxrigel.

Saponariella Heeger. — 7, in Gärten in der Umgebung Wiens.

Striolatella Z. — 6, Mauer, Himmelswiese und Rodanner Gaisberg, selten. Sack an *Centaurea*.

Onosmella Brahm. — 6, 7, Prater, Liechtenstein, Eichkogel. Sack an *Echium vulgare*, *Anchusa officinalis*, *Achillea Millefolium*.

Chamaedryella Stt. — 6, Liechtenstein, Richardshof, auf grasreichen Stellen, auf Berglehnen.

Striatipennella Tgstr. — 9, Mauer, Rodaun auf Berglehnen, auch auf dem Gahns, auf der Bodenwiese.

Therinella Tgstr. — 7, 8, Liechtenstein, Laaerberg, Baden auf Berglehnen zwischen Hecken. Sack an *Artemisia*.

Trogodytella Dup. — 7, Liechtenstein, Eichkogel auf Berglehnen und Bergen, wo *Inula* vorkommt. Sack an *Inula* und *Artemisia*.

Inulae Wke. — Von Herrn Eduard Kreithner in den Donau-Auen bei Spillern der Sack im August auf *Inula salicina* gefunden.

Pratella Z. — 6, bei Moosbrunn auf Torfwiesen gefangen.

Lineolea Hw. — 6, in der Wiener Gegend auf Berglehnen. Sack an *Stachys sylvatica* und *Ballota nigra*.

Nutantella Mühlig. — 7, in Weidling-am-Bach, Hermannskogel.

Lineariella Z. — 5, 6, Prater, dann von Tivoli bis Baden auf Berglehnen und auf dem Schneeberge.

Dianthi HS. — 5, 6, Mödling, auf der Berghöhe, bei der goldenen Stiege.

Succursella HS. — 8, Prater, Rodaun, Bisamberg.

Silenella HS. — 6, Mauer bis Baden auf Berglehnen.

Ciconiella HS. — 6, 7, in den Remisen bei Tivoli und dem Laaerberge.

Millefolii Z. — 7, 8, auf den Berglehnen bei Mödling und Baden.

Directella Z. — 7, 8, Mauer bis nach Baden auf Berglehnen und Bergen, auch im Saugraben.

Gnaphalii Z. — 6, 7, Bisamberg und Korneuburg.

Motacillella Z. — 6, 7, Wien an Gartenzäunen und Mauern. Sack auf *Chenopodium* und *Atriplex*.

Argentula Z. — 6, in den Remisen bei Tivoli. Sack an den Blüten von *Achillea Millefolium*.

Granulatella Z. — 7, Wien in Gärten und bei Tivoli und Mauer. Sack an *Artemisia campestris*.

Virgaureae Stt. — 5, 6, bei Tivoli, Mauer, Richardshof und Baden in jungen Gebüschchen.

Asteris Mühlig. — Brühl an Berglehnen und Waldrändern.

Artemisiae Mühlig. — 7, Rodauner Gaisberg, Giesshübel an Waldrändern.

Otitae Z. — 6—8, im Prater, Möd-

ling, Baden um Hecken. Sack an den Wurzelblättern der *Silene Otites*.

Laripennella Zett. (*Annulatella Tgstr.*) — 7, in Gärten, im Prater und auf Berglehnen.

Flavaginella Z. — 8, Kuhschneeberg und Saugraben am Schneeberg.

Taeniipennella HS. — 6, im Prater auf *Parietaria officinalis*.

Otidipennella HS — 5, Mauer, Himmelswiese auf Graslehnen.

Murinipennella Dup. — 4, 5, überall in der Wiener Gegend auf Hutweiden und Wiesen.

Caespititiella Z. — 6, im Prater an Gebüschrändern; 7, auf den Schneeberger Alpen. Sack an *Alnus incana*.

Gonidoma Z.

Auroguttella F. R. — 8, 9, in Wien an Gartenzäunen. Sack an den Blüten von *Atriplex laciniata*.

Lavernidae.

Chauliodus Tr.

Illigerellus Hb. — 6, im Prater in Erlengebüsch.

Scurellus HS. — 6, 7, Schneeberger Alpenwiesen.

Pontificellus Hb. — 6, überall in der Wiener Gegend auf Berglehnen und Bergen.

Insecurellus Stt. — 5, Laaerberg, spät Abends auf Grasplätzen.

Aequidentellus Hofm. — 7, Gahns, Lackerboden auf *Epilobium*.

Chaerophyllellus Goeze. — 5, 8, bei Tivoli, im Prater und am Bisamberg, Oberweiden. Die Herren v. Hornig und Rogenhofen haben diese Art aus Raupen auf *Seseli coloratum* erzogen.

Ochromolopis Hb.

Ictella HS. — 5, 6, überall in der Wiener Gegend, auch auf Alpen.

Schreckensteinia Hb.

Festaliella Hb. — 6, 7, Prater, Bisamberg, Mauer, selten.

Cyphophora HS.

Idaei Z. — 6, 7, Schneeberger Alpen, Alpeleck, Lackerboden.

Laverna Curt.

Conturbatella Hb. — 6, 7, Schneeberger Alpen. Raupe auf *Epilobium angustifolium*, in jungen Herzblättern.

Lacteella Stph. — 5, 6, Gaisberg bei Rodaun, Giesshübel, 7, auf Alpen, sehr selten. Raupe auf *Epilobium*-Arten.

Propinquella Stt. — 7, auf der Heuplacke mehreremale gefangen.

Decorella Stph. — 6, in den Praterauen, auch auf dem Lackerboden und am Alpeleck.

Subbistrigella Hw. — 7, 8, Kaltentgeben, Aninger, Schneeberger Alpen.

Fulvescens Hw. (*Epilobiella* Schr.) — 7, an Gräben, Bächen, Waldrändern. Raupe in den zusammengesponnenen Herzblättern des *Epilobium hirsutum*.

Ochraceella Curt. — 7, auf dem Kuhschneeberg, Lackerboden, Brandstattwiese, sehr selten.

Epilobiella Roemer. (*Longiella* Hb.) — 5, 6, Mauer, Mödling, Baden auf Lehnen und an Waldrändern.

Ascalenia Wk.

Vanella Frey. — 6, im Prater an den Planken des Fasanggartens beim Lusthaus und in Stadlau. Raupe in Trieben von *Tamarix germanica*.

Mompha HS.

Rhamniella Z. — 6, Tivoli und Mauer in jungen Laubgebüsch.

Stagmatophora HS.

Heydeniella F. R. — 6, Mödling, Purkersdorf, dann Alpen, Gahns auf Heidekraut (in Steiermark häufig).

Pomposella Z. — 6, Mauer, Himmelswiese und bei der Schiessstätte um Gestrüch, sehr selten.

Serratella Tr. — 6, Wiener Gegend auf Berglehnen, sehr selten.

Albiapicella HS. — 5, überall in der Wiener Gegend auf Berglehnen

und auf den Alpen. Raupe in den Samen der *Globularia vulgaris*.

Pyroderces Z.

Argyrogrammos Z. — 6, im Prater auf den Hirschweiden. Raupe nach Herrn v. Hornig in Klettenköpfen.

Stathmopoda Stt.

Pedella L. — 7, 8, im Prater auf Erlen. Raupe in den Früchten von *Alnus*.

Heinemannia Wk.

Festivella Schiff. — 6, am Bisamberge im Gebüsch, sehr selten.

Laspeyrella Hb. — 6, 7, Mauer, Mödling und Baden in jungen Gebüschern, selten.

Blastodacna Wk.

Hellerella Dup. — 6, Prater, Mauer, Dornbach auf Weissdorn und Obstbäumen. Raupe auf *Crataegus* und Obstbäumen in den Blütenknospen.

Tebenna HS.

Miscella Schiff. — 5–8, überall in der Wiener Gegend, auch auf den Alpen, in Remisen und auf Berglehnen.

Stephensi Stt. — 6, auf Hutweiden und an Waldrändern auf Disteln, auch an Eichenstämmen, selten.

Raschkiella Z. — 7, Schneeberg auf dem Gahns, Alpeleck und der Krumbachriese. Raupe auf *Epilobium angustifolium*, selten.

Chrysoclista Stt.

Aurifrontella Hb. — 5, Prater, Brigittenau, Tivoli, Mauer, auf Weissdornbäumen. Raupe auf *Crataegus* und *Acer* im Mark der Zweige.

Bimaculella Hw. — 5, 6, Prater, Brigittenau an Weidenstämmen. Raupe wohl auf *Salix* in der Borke?

Linneella Cl. — 7, Klosterneuburg, Hetzendorf, an Lindenstämmen. Raupe in der Borke von *Tilia*.

Psacaphora HS.

Schranckella Hb. — 6, 7, Schneeberger Alpen, Saugraben, Alpeleck, Lackerboden, selten.

Aechmia Stt.

Dentella Z. — 6, Rodaunerberg, Mauer auf Gräsern. Raupe auf *Angelica sylvestris*.

Douglasidae.

Tinagma Z.

Perdicellum Z. — 5, 6, Wiener Gegend in lichten Wäldchen auf Erdbeerblüthen, Gahns, Lackerboden. Raupe auf *Fragaria vesca* an den Blüten.

Douglasia Stt.

Balteolella F. R. — 5, Rodauner Berg, auch bei Baden.

Herrichiella HS. — 5, 6, Laaerberg in Remisen.

Transversella Z. — 5, Rodann, Mödling auf Berglehnen und Wiesen.

Ocnorostomella Stt. — 6, bei Gumpoldskirchen am *Echium vulgare*. Raupe an *Lonicera Xylosteum* in Blasenminen.

Heydenia Hofm.

Fulviguttella Z. — 6, Schneeberger Alpen, Saugraben und Brandstattwiese am *Epilobium*.

Metriotes HS.

Modestella Dup. — 5, bei Tivoli, überhaupt in der Wiener Gegend an den Blüten von *Stellaria Holostea*. Raupe in den Samenkapseln von *Stellaria Holostea*.

Augasma HS.

Aeratellum Z. 1839. — 6, Bisamberg, Mödling, Baden auf Berglehnen und an Waldrändern, selten. Raupe in aufgetriebenen Stengeln von *Polygonum aviculare*.

Butalidae.

Butalis Tr.

Obscurella Sc. — 7, 8, Schneeberger Alpen, Alpeleck, Lackerboden auf *Epilobium*. Raupe auf *Epilobium angustifolium*.

Productella Z. — 7, Gahns, Bodenwiese, Lackerboden, Saugraben am

Schneeberge um *Epilobium*. Raupe ebenfalls auf *Epilobium*.

Seliniella Z. — 5, 6, überall in Oesterreich auf Wiesen, Berglehnen und Alpen.

Subseliniella Hein. — 6, Moosbrunn auf den Torfwiesen. (Ob gute Species? bezweifle ich.)

Fallacella Schl. — 7, 8, Schneeberg, Heuplacke und Sangraben, auch auf der Bodenwiese. Raupe auf *Helianthemum vulgare*.

Flaviventrella HS. — 6, Mödling, Brühl auf *Centaurea*-Blüthen, sehr selten.

Paulella HS. — 6, Saugraben auf Steingerölle. (Aufgefunden bei Reichstadt in Böhmen, Kamnitzberg 1830.)

Parvella HS. Z. — 5, Bisamberg, auf Berglehnen.

Laminella HS. — 5, 6, Mauer bis Baden auf Berglehnen, Bisamberg, Emmerberg (neue Welt).

Cuspidella Schiff. — 6, 7, Mauer, Richardshof auf pflanzenreichen Berglehnen und in Remisen.

Leucogaster Mn. — 7, Schneeberg im Saugraben.

Restigerella Z. — 6—8, von Mauer bis Glognitz verbreitet, auf trockenen Berglehnen. Raupe auf *Helianthemum vulgare*, von Herrn v. Hornig gezogen.

Chenopodiella Hb. — 6—9, in Wien, Prater an Zäunen und Gartenmauern. Raupe auf *Chenopodium* und *Atriplex* in zusammengezogenen Blättern.

Noricella Z. — 8, am Schneeberg in Holzschlägen.

Dissimilella HS. — 7, Alpeleck am Schneeberge auf Himbeeren, sehr selten. Raupe wohl auf *Epilobium*?

Inspersella Hb. — 7, auf den Schneeberger Alpen auf *Epilobium*. Raupe auf *Epilobium angustifolium*.

Sicella Z. 1839. — 5, Bisamberg, bei der Pyramide, sehr selten.

Cicadella Z. — 5, Brühl auf Berglehnen auf Distelblüthen, sehr selten.

Endrosis Hb.

Lacteella Schiff. — Das ganze Jahr hindurch überall in Oesterreich in Mehlkammern. Raupe in Mehl, Abfällen und getrockneten Früchten.

Pancalia Curt.

Latreillella Curt. — 5, 8, überall auf trockenen Wiesen und Berglehnen.

Leuwenhoekella L. — 5, 8, auf trockenen Wiesen und Berglehnen. Raupe auf *Thymus*.

Elachistidae.

Scirtopoda Wk.

Saltatricella F. R. — 4, 5, Tivoli- und Laaerbergremisen auf *Ulmus* und jungen *Quercus*.

Elachista Stt.

Cingillella HS. — 6, Tivoli, Laaerberg, Maner, Prater in Gebüsch.

Megerlella St. — 6, Mauer, Himelwiese am Waldsaume in Hecken, Gahns, Lackerboden. Raupe auf *Brachypodium sylvaticum*.

Cintella Z. — 7, Schneeberger Alpen und Wiener Gegend um junge Gebüsch und Gräser. Raupe in *Sesleria coerulea* und *Carex acuta*.

Adscitella Stt. — 6, in der ehemaligen Brigittau in Wien an Zaunplanken.

Revinctella Z. — 5, 6, Prater und Tivoli auf jungen Gebüsch; Hochschwab und Schneeberg.

Taeniatella Stt. — 5, 6, Tivoli in den Remisen auf Gesträuch, selten.

Chrysodesmella Z. — 6, Taborau, Prater, Rodaun, Giesshübel in Gebüsch und an Zaunplanken. Raupe in *Carex montana*.

Gangabella Z. — 5, 6, Mauer, Mödling und auf dem Gahns um Hecken, auch um Kiefern.

(Fortsetzung folgt.)